

اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر احساس عاملیت و میانگین هفتگی قند خون ناشتا در بیماران دیابتی

محمدامیری^۱، *کریم عسگری مبارکه^۲، سید حمیدرضا عربیضی^۳

۱. دانشجوی دکترای روان شناسی دانشگاه اصفهان.

۲. دانشیار علوم اعصاب دانشگاه اصفهان.

۳. استاد روان سنجی دانشگاه اصفهان.

(تاریخ وصول: ۹۶/۱۱/۰۱ - تاریخ پذیرش: ۹۷/۰۷/۱۲)

The effect of stress inoculation training (SIT) on the sense of agency and average weekly fasting blood sugar in diabetic patients

*Mohammad Amiri¹, *Karim Asgari Mobarakeh², Hamid Reza oreizi³*

1. Ph.D. student of psychology, Isfahan University

2. Associate Professor of Neuroscience, Isfahan University

3. Psychometric professor of Isfahan University

(Received: Jan. 21, 2018 - Accepted: Oct. 04, 2018)

چکیده

Abstract
Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of Stress inoculation training (SIT) on the sense of agency and average weekly fasting blood sugar in diabetic patients. **Method:** was quasi-experimental and the population of this study included 2450 diabetic patients in Um Al-Banin Clinic in Isfahan. Among them, 17 women and 9 men were randomly selected and subjected to two experimental groups (10 women and 4 men) and control (5 women and 7 men). The questionnaires the researcher made a weekly average of diabetic blood glucose and a sense of agency before and after intercourse. The experimental group received the (SIT) in 6 sessions of 90 minutes weekly, but the control group did not receive this training. **Result:** The results of this study showed that the mentioned training significantly increased ($p < 0.001$) in the mean scores of the sense of agency and their components and the mean of the weekly average of the fasting blood sugar of the experimental group was significantly lower than that of the control group. **Conclusion:** (SIT) can be used as an effective interventional method for reducing the average weekly fasting blood sugar level and improving the sense of agency of diabetic patients.

Keywords: : Stress Inoculation Training, sense of agency, Blood Glucose, Diabetes.

مقدمه: پژوهش حاضر به تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر احساس عاملیت و میانگین هفتگی قند خون ناشتا بیماران دیابتی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری آن شامل ۲۴۵۰ نفر بیماران دیابتی درمانگاه ام البنین اصفهان بود که از میان آنها ۱۷ زن و ۹ مرد به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (۱۰ زن و ۴ مرد) و گواه (۵ زن و ۷ مرد) جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه های محقق ساخته میانگین هفتگی قند خون بیماران دیابتی و احساس عاملیت را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. گروه آزمایش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس را طی ۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای بصورت هفتگی دریافت کرد ولی گروه گواه تحت این مداخله قرار نگرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مذکور موجب افزایش معنادار ($p < 0.01$) در میانگین نمرات متغیر های احساس عاملیت و کاهش معنادار میانگین هفتگی قند خون گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است. نتیجه گیری: آموزش ایمن سازی در مقابل استرس می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید، برای کاهش میانگین هفتگی قند خون ناشتا و بهبود احساس عاملیت بیماران دیابتی به کار رود.

واژگان کلیدی: آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، احساس عاملیت، قند خون، دیابت.

*نویسنده مسئول: کریم عسگری مبارکه

Email: asgari_ir@yahoo.com

***Corresponding Author:** Karim Asgari Mobarakeh

مقدمه

با اختلالات عصبی و روانپزشکی (مور^{۱۱}، کمبریج^{۱۲}، مورگان^{۱۳}، گیرواندو^{۱۴}، ادپا^{۱۵} و فلتچر^{۱۶}، ۲۰۱۳) و نیز با بهزیستی روانشناسی هیجانی و بین فردی در بیماران جسمی (پیرو^{۱۷}، زولدو^{۱۸}، کنایت^{۱۹}، میتکو^{۲۰} و گرادیشور^{۲۱}، ۲۰۰۱) ارتباط مثبت دارد. احساس قدرت ابتکار عمل و هدایت آن در مسیر نیل به هدف، و بدیگر سخن اعماق اراده بر پدیده های مادی پیرامون خود، جلوه ای از احساس عاملیت است (کاوازانآ^{۲۲}، پنولاژی^{۲۳}، بیگلیمینی^{۲۴}، بیساکچی^{۲۵}، ۲۰۱۴). با این حال هنوز راه زیادی مانده تا بتوان به درک مفهوم عاملیت، و نقش آن در زندگی انسان نائل آمد و پژوهش های بیشتر می تواند راهگشای درک معنای عاملیت باشد (داوید^{۲۶}، اوپهی^{۲۷}، مور^{۲۸}، ۲۰۱۵).

مرور برخی از مفاهیم حاصل از تحقیقات اخیر پنجره ایست رو به فهم معنای عاملیت، و از جمله ای آنها دیدگاه جنتچ^{۲۹} (۲۰۱۲) است که احساس عاملیت را شامل ۳ جزء می داند که در دو جایگاه خود را نشان می دهد. یکی در ذهن بصورت باور به انجام عمل (خودکارا مدی) و

دیابت قندی یک اختلال متابولیک مزمن است و به عنوان بحران سلامت بین المللی قرن بیست و یکم شناخته شده است (جاکس^۱، سیگل^۲، جوجیral^۳ و نارایان^۴، ۲۰۱۶). چالش های بهداشتی با این بیماری در دهه های اخیر بار اقتصادی فراوانی را به جوامع تحمیل کرده است (باکر^۵، گیل^۶، فریل^۷، کری^۸ و کای^۹، ۲۰۱۷). صاحب نظران بر این باورند که شیوع دیابت نوع ۲ در جهان که اخیرا شتاب بیشتری گرفته است، ارتباط مشخصی با تغییر در ویژگی های ژنیکی و قومیتی افراد ندارد بلکه تغییر در سبک زندگی افراد و گسترش مدرنیته در جوامع بیشترین تأثیر را در افزایش بروز آن دارد (زمیمت^{۱۰}، ۲۰۱۷). از دیگرسو نتایج برخی پژوهش ها حاکی از تأثیر صفات شخصیتی نظری ثبات هیجانی و روان رنجوری بر پیروی و تبعیت از درمان در بیماران دیابتی است (بیات اصغری، غرایی، حیدری، موسی نژاد، جواهری و آرامون، ۲۰۱۵).

احساس عاملیت درده های اخیر، توجه روزافزون روانشناسان، فیلسفه ایان، متخصصان کامپیوتر، دانشمندان علوم اعصاب، متخصصان مغز و اعصاب و روانپزشکان را بخود جلب کرده و روشن شده است که آشتفتگی در احساس عاملیت

11 .Moore, J. W.

12 .Cambridge, V. C.

13 .Morgan, H.

14 .GI Orlando, F. R. A. N. C. E. S. C. O.

15 .Adapa, R.

16 .Fletcher, P. C.

17 .Piro, M.

18 .Zoldow, P. B.

19 .Knight, S. J.

20 .Mytko, J. J.

21 .Gradishar, W. J.

22 .Cavazzana, A.

23 .Penolazzi, B.

24 .Begliomini, C.

25 .Bisiacchi, P.S.

26 .David, N.

27 .Obhi, S.

28 .Moore, J. W.

29 .Gentsch, A.

1 .Jacks LM.

2 .Siegel KR.

3 .Gujral UP.

4 .Narayan KMV.

5 .Baker, P.

6 .Gill, T.

7 .Friel, S.

8 .Carey, G.

9 .Kay, A.

10 Zimmet, P. Z.

بیمار به عنوان علل و دلایل بروز اختلال شمرده می شوند و این مایه ای برای پیدایش هذیان می شود، عقیده‌ی باطلى که با منطق اصلاح پذیر نیست و بخش مهمی از دلیل شکل گیری آن خدشه ایست که بر قضاوت بیمار راجع به عاملیت پدید آمده است (بوهلر^۱، کیندلر^۲، اشنایدر^۳، استریک^۴، دیرکس^۵، هوبل^۶ و همکار، ۲۰۱۶). این حالت گاه با سبب شناسی کاملا مغزی و در حالت هایی همچون همی_پلزی روی می دهد که طی آن بیمار قضاوتی کاملا مغشوش در مورد اعمال خود دارد و آنها را ناشی از انگیزه و ارده‌ی خود نمی داند (سینوفیزیک و همکاران، ۲۰۰۸). نتایج تحقیق سانتوس^۷، سیگولم^۸، آرکو^۹، گابای^{۱۰}، دیب^{۱۱} و برناردو^{۱۲} (۲۰۱۵) برروی نوجوانان مبتلا به دیابت نیز نشان داد در میان عوامل موثر بر کنترل دیابت، اميد، "انتظارات درونی مثبت" و یا خوش بینی به طور قابل توجهی با میزان قند خون در دوره‌ی سه ماهه‌ی پیش از معاینه ارتباط دارد. این محققان پیشنهاد کرده اند راهبردهایی برای افزایش عوامل مذکور ابداع و تاثیر آنها بررسی شود. بنابرآنچه تاکنون توضیح داده شد می توان نتیجه گرفت پذیرش ارتباط بین عاملیت و وقوع بیماری نیاز به تغییر اساسی در نگرش بیمار دارد (کارپ^۱،

دیگری در محیط بصورت آغازگری عمل (خوشنی در رسیدن به هدف) و حفظ هدفمندی عمل تا رسیدن به هدف (پاچیری^{۱۳}، ۲۰۰۷). از نظر گالاگر^{۱۴} (۲۰۰۰) مفهوم احساس عاملیت به معنای این است که من اعمال خود را سامان میدهم و عامل و باعث ایجاد اعمالم هستم. البته احساس عاملیت برای فرد همواره واضح نیست و پیگیری زنجیره‌ی علت و معلول، آنرا در پرده‌ای از ابهام قرار می دهد.

برای رفع این ابهام لازم است که دو پدیده احساس عاملیت و قضاوت درباره‌ی آن را از یکدیگر جدا سازیم. منظور از احساس عاملیت، ادراک خود بعنوان عامل یک تجربه محدود و متمایز است، ولی قضاوت شامل اسناد علی یک سلسله از رفتارها به خود است و نوعی احساس فاعلی بسیط را در بر می گیرد. (سینوفیزیک^{۱۵}، وسگارو^{۱۶} و نیون^{۱۷}، ۲۰۰۸). قضاوت درباره عاملیت در برخی بیماریها مانند اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) و اسکیزوفرنی دچار اختلال می شود و بخش مهمی از نشانه شناسی اینگونه اختلال‌ها از آسیب وارد به قضاوت عاملیت حکایت دارد، و بدین ترتیب خدشه به قضاوت عاملیت انسان، مساویست با حدوث اختلال روانی (جنتچ، ۲۰۱۲). نکته‌ی مهم دیگر آنست که از دیدگاه نشانه شناختی، گاه علل و دلایل همراستا با برخی از علل و اسباب، در عین حال که هیچگونه جنبه‌ی علی ندارند از سوی

-
- 6 .Buhler, T.
 - 7 .Kindler, J.
 - 8 .Schneider, R. C.
 - 9 .Strik, W.
 - 10 .Dierks, T.
 - 11 .Hubl, D.
 - 12 .Santos, F. R.
 - 13 .Sigulem, D.
 - 14 .Areco, K. C.
 - 15 .Gabby, M. A.
 - 16 .Dib, S. A.
 - 17 .Bernardo, V.

-
- 1 . Pacherie, E.
 - 2 . Gallagher, S.
 - 3 .Synofzik, M.
 - 4 .Vosgerau, G.
 - 5 .Newen, A.

امیری ، عسگری مبارکه و عربیضنی: اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر احساس عاملیت...

(خلیقی‌ژاد^۸، دیکوستا^۹، و هگارد^{۱۰}، ۲۰۱۶). با توجه به نکاتی که گفته شد آموزش مهارت‌های مدیریت استرس می‌تواند در کاهش اثرات زیانبار استرس بر کارکردهای زیست شناختی بیماران را یاری کند. آموزش ایمن سازی در مقابل استرس یاری کند (SIT) یکی از انواع روش‌های شناختی-^{۱۱} رفتاری و جزو رایج ترین روش‌های درمان است که توسط مایکنباوم^{۱۲} (۲۰۰۸) ابداع شده و تکامل یافته است (مایکنباوم، ۲۰۱۷). در آموزش ایمن سازی در مقابل استرس افراد برای پیش‌بینی شرایط استرس‌زا و راه‌های عملی مقابله با آن درآینده آموزش داده می‌شوند تا بتوانند استرس ناشی از آن را کنترل کنند. مایکن باوم بتاکید بر عوامل شناختی- رفتاری که آموزش ایمن سازی در مقابل استرس یکی از آنهاست راههایی را پیش روی افراد می‌گذارد تا در برابر عوامل استرس‌زا قربانی نشوند و دارای قدرت واکنش باشند (جوکار، رحمتی، ۲۰۱۵).

در تائید تاثیر مداخلات روانشنختی مشابه آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، می‌توان به یافته‌های سندي، احتشامزاده، عسگری و کافى (۱۳۹۶) اشاره کرد که نشان دهنده‌ی تاثیر مثبت و معنادار سبک مقابله هیجان مدار بر علائم اضطراب و افسردگی بیماران است همچنین نتایج پژوهش هاشمی، فیلی و صفاری نیا (۲۰۱۴) حاکی از آنست که آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی-رفتاری) در بهبود مشکلات

(کارپ^۱، ۲۰۱۶) در حقیقت کاهش احساس عاملیت مترادف بیماری است.

از سوی دیگر استرس به عنوان عاملی خطرزا برای سلامتی در دهه‌های اخیر مورد توجه بوده است و مطالعات متعدد نشان داده‌اند که افراد دارای استرس بالا شکایات روان-تنی بیشتری را مطرح می‌کنند (جعفری، کلاب و مهاجرانی، ۲۰۱۷). استرس عامل موثر در ایجاد و یا افزایش عوارض بیماری‌های مزمن جسمی است و براساس یافته‌های فیزیولوژی عاملی است که تندرنستی انسان از نظر روانی و جسمی را با یکدیگر پیوند می‌دهد. (اورلی^۲، لاتینگ^۳، ۲۰۱۲).

رونده اثرگذاری استرس در بدن، با محرك‌های فیزیولوژیک و روان‌شناختی آغاز می‌شود که بنوبه‌ی خود باعث فعالسازی محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA)^۴ می‌شوند. این محور اهمیت ویژه‌ای در متابولیسم بدن و فرایند تنظیم قند خون در حالت‌های سلامت و بیماری دارد (جوزف^۵ و گلدن^۶، ۲۰۱۷) پایداری بیشتر محرك‌های روانشنختی مولد استرس باعث افزایش عوارض دیابت، کاهش مکانیزم فیدبک منفی روی محور (HPA) و افزایش نقص کارکرد این محور در بلند مدت خواهد شد (جوزف و گلدن، ۲۰۱۷). که نتیجه‌ی آن تحریک دائمی محور HPA و بروز حالت هیپکورتیزولیسم^۷ در بیماران دیابتی است

1 .Karp, D. A.

2 .Everly Jr, G. S.

3. Lating, J. M.

4 .hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis

5 .Joseph, J. J.

6 .Golden, S. H.

7 Hyper cortisolism.

8 .Khalighinejad, N.

9 .Di Costa, S.

10 .Haggard, P.

11 .Stress inoculation training (SIT)

12 .Meichenbaum

حجم گروه آزمایش و گواه به ترتیب به ۱۴ و ۱۲ نفر رسید. معیارهای ورود عبارت بودند از: ۱- ابتلا به دیابت با تأیید پزشک به مدت حداقل یک سال، در تبیین نمونه گیری از بیماران نوع یک و دو لازم است به این نکات توجه شود که تفاوت میان انواع ۱ و ۲ دیابت ناشی از علت (ژنتیکی یا غیر ژنتیکی)، نوع بروز (تدریجی یا ناگهانی)، سن شروع (قبل از ۲۵ سالگی یا بعد از آن) و وابستگی به نوع داروی انتخابی در بیمار است (انجمان دیابت آمریکا، ۲۰۱۴). بنابراین تعیین نوع دیابت یک روش قراردادی وابسته به زمان و حالت بروز بیماری است و تفاوت ماهیتی در تولید استرس (متغیر مستقل پژوهش حاضر)، بروز علائم و عوارض دیابت، پیامدهای روانشناسی عدم کنترل قند خون و تاثیر استرس ناشی از (هیپر کورتیزولیسم مزمن) بر میزان قند خون بیماران نوع یک و دو دیده نشده است (الاولو، ۲۰۱۵، زابلوتسکی و همکاران، ۲۰۱۳ و وانگ و همکاران، ۲۰۱۱). ۲- داشتن حداقل سن ۱۸، ۳- داشتن حداقل تحصیلات ابتدائی، ۴- عدم ابتلا به بیماریهای شدید روانی مانند اختلالات پسیکوتیک و عدم مصرف داروهای روانگردان یا سوء مصرف مواد در زمان انجام پژوهش. ۵- نداشتن عوارض شدید و منجر به بستری شدن بیمار دیابتی، ۶- داشتن دستگاه گلوکومتر و مهارت استفاده از آن توسط خود بیمار و یا یکی از اعضای خانواده او، ۷- همچنین غیبت ییش از دو جلسه در جلسات درمانی و ۸- بروز استرس‌های مهم ناشی از حوادث پیش بینی نشده به عنوان معیارهای خروج از پژوهش در نظر گرفته شدند.

روانشناسی زنان باردار مفید بوده است جهت افزایش سلامت روان زنان نابارور بکار رود. باسته است به این نکته اشاره شود که پژوهشگر در بررسی های خود به تحقیقی که به ارتباط احساس عاملیت و میانگین هفتگی قند خون بیماران دیابتی پرداخته باشد دست نیافته است. بنا به همین ضرورت مطالعه حاضر برای تعیین اثربخشی اموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر بهبود احساس عاملیت و کاهش میانگین هفتگی قند خون بیماران دیابتی طراحی و انجام شد.

روش

پژوهش حاضر از نوع طرح‌های کاربردی و شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون، همراه با گروه کنترل است. پروتکل مطالعه نیز در کمیته اخلاق دانشگاه اصفهان به شماره IR.UI.REC.1396.031 است. جامعه آماری این مطالعه بیماران مبتلا به دیابت و جامعه هدف، شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو عضو درمانگاه خیریه ام البنین اصفهان بوده اند. سی نفر از بیماران واجد ملاکهای ورود به شیوه نمونه گیری داوطلبانه در دسترس انتخاب و با استفاده از شیوه‌ی تصادفی سازی ساده در دو گروه آزمایش ($N=15$) و کنترل ($N=15$) گمارده شدند. مداخله به روش یک سر کورانجام شد و آزمودنی‌ها از هدف اصلی پژوهش مطلع نبودند. درین اجرای مداخله ۱ نفر از گروه آزمایش و ۳ نفر از گروه گواه بدلا لیل مشکلات شخصی از مداخله کثار رفتند و نهایتا

امیری ، عسگری مبارکه و عربیضنی: اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابله استرس بر احساس عاملیت...

قبل از عمل جراحی تا ۴۰ جلسه یک ساعتی در کار با بیماران روانی و بیماران دارای مشکلات بالینی مزمن قابل انعطاف دانسته است. بر این اساس تعداد جلسات مداخله کافی بوده و به نظر می رسد که طولانی تر شدن مدت مداخله های آموزشی روانشناسی تاثیری برنتایج نداشته باشد (براون، ۱۹۹۲). در این آموزش شیوه اجرای سه مرحله ای آن یعنی مفهوم سازی مشکل، اکتساب و تمرین مهارت ها، کاربرد ویژگیری مستمر بسته به طول آموزش و جمعیت هدف متفاوت است.

محتوای آموزشی جلسات آموزش ایمن سازی در مقابله استرس برای بیماران دیابتی، که توسط امیری، آقائی، عابدی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. در جدول ۱ آمده است.

فرایند اجرا: پیش از شروع جلسات و با اخذ رضایت آگاهانه، میانگین هفتگی فندخون ناشتاوی هردو گروه با استفاده از گلوکومتر بر مبنای پرسشنامه (WFBSQI) مشخص شد و آزمودنی ها پرسشنامه احساس عاملیت را نیز تکمیل کردند. سپس گروه آزمایش به مدت ۶ جلسه به صورت هفتگی (طبق جدول ۱) تحت آموزش گروهی ایمن سازی در مقابله استرس قرار گرفت. مریبی جلسات آموزشی دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت بود .

در این پژوهش منظور از آموزش ایمن سازی در مقابله با استرس، برنامه درمانی شامل عجلسه ۹۰ دقیقه ای بود که بر مبنای روش مایکن باوم (۲۰۰۸) و با توجه به منابع معتبر طراحی شده و سازنده آن برنامه آموزش ایمن سازی در مقابله استرس را از یک جلسه یک ساعته برای بیماران

جدول ۱. محتوای آموزش ایمن سازی در مقابله استرس (SIT)

جلسه اول	معرفی اعضا، بیان برنامه آموزش و تعدیل انتظارات، مفهوم سازی و توصیف استرس، علائم و تأثیر آن در ایجاد بیماری دیابت و توضیح نقش آموزش ایمن سازی در مقابله استرس در کنترل بهتر استرس و کاهش علائم بیماران. تکلیف: شناخت و دسته بندی استرس ها
جلسه دوم	معرفی علائم جسمی و فیزیولوژی استرس، ارتباط استرس و دیابت، آموزش آرام سازی با استفاده از CD صوتی + آموزش آرام سازی با اجرای درمانگر، تکلیف: انجام و تکرار آرام سازی در منزل
جلسه سوم	آشنایی با مفاهیم شناختی و نقش افکار در ایجاد استرس و ارتباط افکار با احساسات و رفتار و شناسایی آنها، تکلیف: شناسائی روابط بین افکار و احساسات
جلسه چهارم	چالش با افکار استرس زا و آزمون افکار منفی + آموزش خود گویی مثبت و نقش خود گویی های منفی در ایجاد استرس تکلیف: انجام خود گوئی های مثبت در حوادث
جلسه پنجم	آموزش تمرکز فکر و تکنیکهای توجه بر گردانی + آموزش حل مسئله+پیگیری اشکالات جلسات قبل، تکلیف : اجرای فرایند حل مسئله برای یک مشکل لاینحل در زندگی
جلسه ششم	تمرین مهارتهای آموخته شده در جلسات قبل و لزوم به کارگیری این مهارتها در هنگام برخورد با موقعیت استرس زا جهت کاهش نشانه های بیماری

پایایی کافی و مناسب برای ارزیابی و اندازه گیری احساس عاملیت افراد است. همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه احساس عاملیت (SOAQ20) ابزاری با ۳ خرده مقیاس و دارای ۲۰ گویه است که به ترتیب درصد واریانس تبیینی و ارزش ویژه، عبارتند از خوش بینی ۹/۵۸٪، هدفمندی ۴۷/۹۱٪، خودکارآمدی ۶/۷۸٪. نتایج بررسی روائی همزمان نیز حاکی از ارتباط بین پرسشنامه احساس عاملیت و پرسشنامه های موازی خرده مقیاس هدفمندی از آزمون کمالگرائی هیل ۰/۴۵، پرسشنامه معنا و هدف در زندگی ۰/۶۳، پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتز ۰/۶۸ و مقیاس خودارزشیابی های مرکزی ۰/۴۲ همگی درسطح ۰/۰۰۱ بود. همچنین پرسشنامه آزمون جهت گیری زندگی با همبستگی ۰/۲۲ در سطح ۰/۰۲ معنادار بود.

پرسشنامه میانگین هفتگی سطح قند خون ناشتا بیماران دیابتی (WFBSQI)^{۱۷} این پرسشنامه تک سوالی، محقق ساخته به روش خود گزارش دهی بود و درصورتی که بیمار دیابتی حداقل سه بار درروزهای متفاوت هفته با دستگاه گلوکومتر ۱۸ میزان قند خون ناشتای (قبل از خوردن صبحانه) خود را اندازه گرفته باشد با جمع اعداد حاصل از اندازه گیری و سپس تقسیم مجموع حاصله بر تعداد دفعات اندازه گیری می تواند میانگین هفتگی قند خون ناشتای خودرا مشخص نماید. سوال این پرسشنامه و گزینه های آن چنین بود:

متوسط قند خون ناشتای شما در هفته گذشته

17. average weekly fasting blood sugar Questionnaire(WFBSQI)
18 .glucometer

پرسشنامه احساس عاملیت (SOAQ20)^۱:
پرسشنامه احساس عاملیت دارای ۲۰ سوال بوده و توسط نویسنده گان حاضر ساخته شده است. برای ساخت این پرسشنامه ابتدا با بررسی ادبیات پژوهشی مربوط به احساس عاملیت ۷۹ سوال مرتبط استخراج و برای بررسی روائی محتوای در قالب جدول تعیین ضریب لاوشه توسط ۲۰ نفر از متخصصان حوزه های مختلف روانشناسی ارزیابی شد و بنا به نظر آنان تعداد ۳۰ سوال با مقدار ضریب CVR: ۰/۴۲، باقی ماند. سپس تحلیل عاملی و بررسی روائی همزمان انجام شد. ابزارهای مورد استفاده برای بررسی روائی همزمان عبارت بودند از خرده مقیاس ۷ گویه ای هدفمندی آزمون کمالگرائی (هیل^۲، هیولیسمن^۳، فور^۴، کیبلر^۵، ویکنت^۶ و کندی^۷، ۲۰۰۴)، آزمون جهت گیری زندگی خوبیابی، بدینی (اسچیر^۸، کارور^۹، بریجدز^{۱۰}، ۱۹۹۴) پرسشنامه ۱۰ گویه ای معنا و هدف در زندگی فرانکل، مقیاس خودکارآمدی عمومی (شوواتزر^{۱۱}، جراسلم^{۱۲}، ۲۰۱۰، ۱۹۹۵)، مقیاس خودارزشیابی های مرکزی (جاج^{۱۳}، ارز^{۱۴}، بونو^{۱۵} و تورسن^{۱۶}، ۲۰۰۳). نتایج نشان داد که پرسشنامه احساس عاملیت (SOAQ20) دارای

1 .Sense of Agency Questionnaire (SOAQ20)

2 .Hill, R. W.

3 .Huelsing, T. J.

4 .Furr, R. M.

5 .Kibler, J.

6 .Vicente, B. B.

7 .Kennedy, C.

8 .Scheier, M. F.

9 .Carver, C. S.

10 .Bridges, M. W.

11 .Schwarzer, R.

12 .Jerusalem, M.

13 .Judge, T. A.

14 .Erez, A.

15 .Bono, J. E.

16 .Thoresen, C. J.

امیری، عسگری مبارکه و عربیضنی: اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر احساس عاملیت...

آزمودنی‌های گروه آزمایش، ۴ نفر مرد و ۱۰ نفر زن، و آزمودنی‌های گروه کنترل، ۵ نفر مرد و ۷ نفر زن بودند. میانگین مدت‌زمان ابتلا به دیابت آزمودنی‌های گروه آزمایش، $5/14$ سال (انحراف معیار = $4/32$) و آزمودنی‌های گروه کنترل، $9/08$ سال (انحراف معیار = $7/71$) بوده است.

پس از بررسی برقراری پیش فرض های آزمونهای پارامتریک برای تحلیل نتایج احساس عاملیت از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و برای تحلیل داده های حاصل از متغیر قند خون از تحلیل کوواریانس بوسیله نرم افزار SPSS-19 استفاده شد.

چقدر بوده است؟ کمتر از 140 ، کمتر از 180 ، کمتر از 220 ، کمتر از 260 ، کمتر از 300 ، بیش از 300 .

یافته‌ها

نتایج حاصل از داده‌های جمعیت‌شناختی، نشان می‌دهد، ۳ نفر از آزمودنی‌های گروه آزمایش و ۵ نفر از گروه کنترل، مبتلا به دیابت نوع یک و دیگر بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بوده اند، میانگین سنی آزمودنی‌های گروه آزمایش، $47/4$ (انحراف معیار = $10/78$) و آزمودنی‌های گروه کنترل، $53/2$ (انحراف معیار = $11/11$) بوده است.

جدول ۲. نتایج آزمون شاپیرو-ولیک در بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات پیش‌آزمون متغیر عاملیت و زیرمقیاس‌های آن در دو گروه آزمایش و کنترل

متغیر	گروه	شاخص	آماره	درجه آزادی	معناداری
عاملیت	آزمایش		۰/۹۳	۱۳	۰/۴۳
	کنترل		۰/۹۷	۱۲	۰/۹۴
خودکارآمدی عمومی	آزمایش		۰/۸۴	۱۳	۰/۰۶
	کنترل		۰/۹۰	۱۲	۰/۱۶
خوشبینی	آزمایش		۰/۹۲	۱۳	۰/۳۲
	کنترل		۰/۹۲	۱۲	۰/۳۱
هدف‌مندی	آزمایش		۰/۹۲	۱۳	۰/۲۵
	کنترل		۰/۸۶	۱۲	۰/۰۶
میانگین قند خون	آزمایش		۰/۸۴	۱۳	۰/۰۱
	کنترل		۰/۸۱	۱۲	۰/۰۱

جدول ۳. نتایج آزمون ناپارامتریک نرمال بودن داده‌ها در متغیر میانگین قند خون در مرحله پس آزمون

متغیر	میانگین قند خون	مرحله شاخص	یومان_ویتنی	ویلکاکسون	Z	معناداری
پس آزمون	۵۱/۰۰	۱۵۶/۰۰	-۱/۸۶	۰/۰۵		

جدول ۴. آزمون همگنی واریانس‌ها در متغیرهای عاملیت

متغیرها	ضریب F	درجه آزادی ۱	درجه آزادی ۲
عاملیت	۴/۲۸	۱	۲۴
خودکارآمدی عمومی	۰/۳۲	۱	۲۴
خوشبینی	۱/۷۸	۱	۲۴
هدفمندی	۲/۳۶	۱	۲۴

جدول ۵. مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر عاملیت و زیرمقیاس‌های آن در دو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

نام متغیر	گروه	تعداد	پیش آزمون	میانگین	انحراف معیار	پس آزمون	میانگین	انحراف معیار
عاملیت	آزمایش	۱۴	۷۳/۵۰	۱۴/۹۹	۹۴/۲۱	۶/۲۹	۹۴/۲۱	۱۴/۹۹
خودکارآمدی عمومی	کنترل	۱۲	۷۹/۱۶	۱۶/۴۴	۷۷/۶۶	۱۶/۶۹	۷۷/۶۶	۱۶/۴۴
خوشبینی	آزمایش	۱۴	۲۰/۰۷	۴/۰۳	۲۷/۲۸	۳/۷۲	۲۷/۲۸	۴/۰۳
هدفمندی	کنترل	۱۲	۲۰/۸۳	۳/۸۳	۲۰/۳۳	۳/۸۲	۲۰/۳۳	۳/۸۳
میانگین قند خون	آزمایش	۱۴	۳۳/۲۱	۷/۶۸	۴۱/۳۵	۲/۶۱	۴۱/۳۵	۷/۶۸
میانگین قند خون	کنترل	۱۲	۳۵/۱۶	۸/۰۷	۳۴/۵۸	۷/۷۳	۳۴/۵۸	۸/۰۷
میانگین قند خون	آزمایش	۱۴	۱۹/۷۱	۴/۴۷	۲۵/۵۷	۲/۹۷	۲۵/۵۷	۴/۴۷
میانگین قند خون	کنترل	۱۲	۲۳/۱۶	۵/۶۳	۲۲/۷۵	۵/۶۵	۲۲/۷۵	۵/۶۳
میانگین قند خون	آزمایش	۱۴	۲/۶۴	۱/۷۸	۱/۶۴	۰/۸۴	۱/۶۴	۱/۷۸
میانگین قند خون	کنترل	۱۲	۱/۹۱	۰/۹۰	۲/۲۵	۰/۹۶	۲/۲۵	۰/۹۰

امیری ، عسگری مبارکه و عربیضنی: اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر احساس عاملیت...

برای بررسی این که تفاوت بین میانگین های نمرات دو گروه در کدام مقیاس ها معنادار بوده است از آزمون تعقیبی LSD استفاده شده است.

همانطور که در جدول ۷ مشاهده می شود تفاوت بین دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون، برای متغیرهای احساس عاملیت، خودکارآمدی عمومی، خوش بینی و هدفمندی معنادار است. بنابراین آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، بر بهبود این متغیرها در بیماران مبتلا به دیابت، مؤثر بوده است.

جدول ۸ نشان می دهد تفاوت بین دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون، برای متغیر میانگین هفتگی قند خون ناشتا معنادار است. بنابراین آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، بر بهبود این متغیر در بیماران مبتلا به دیابت، مؤثر بوده است.

با توجه به عدم معناداری آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک برای بررسی نرمال بودن داده های متغیر میانگین قند خون، داده های این متغیر نرمال فرض شدند.

همانطور که در جدول ۴ مشاهده می شود پیش فرض تساوی واریانس ها در مورد نمرات متغیر عاملیت و زیر مقیاس های آن تأیید می گردد. میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر عاملیت و زیر مقیاس های آن در گروه آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در جدول ۵ آمده است.

نتایج تحلیل واریانس چند متغیره دو گروه در متغیر وابسته احساس عاملیت و زیر مقیاس های آن در مرحله پس آزمون در جدول ۶ ارائه شده است.

نتایج جدول ۶، نشان می دهد حداقل بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در یکی از پنج حوزه احساس عاملیت، خودکارآمدی عمومی، خوش بینی، هدفمندی و میانگین قند خون تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول ۶: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره

عضویت گروهی	ویلکس	ضریب لامبدای	F	درجه آزادی	معنا داری	اندازه اثر	توان آماری
۰/۳۱۶	۱۳/۶۸	۳	۱۹	۰/۰۰۱	۰/۶۸	۰/۹۹	

جدول ۷. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر عاملیت و زیرمقیاس‌های آن

عنوان آزمون	اندازه اثر	معنا داری	F	مجموع مجذورات میانگین مجذورات	منبع تغییرات
عاملیت	۱	۰/۶۴	۰/۰۰۱	۳۸/۴۷	۱۹۳۳/۶۶
خودکارآمدی عمومی	۱	۰/۵۹	۰/۰۰۱	۳۱/۳۲	۲۵۹/۰۶
خوشبینی	۰/۹۹	۰/۰۵۳	۰/۰۰۱	۲۴/۴۱	۳۴۵/۴۹
هدفمندی	۰/۸۷	۰/۰۳۳	۰/۰۰۱	۱۰/۶۰	۸۶/۳۱

جدول ۸. نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه در متغیر هفتگی قند خون پس از کنترل متغیر مداخله‌گر در مرحله پس‌آزمون

مرحله	منبع تغییرات	درجه آزادی	مجموع مجذورات	مجذور اتا	سطح معناداری	F	پیش‌آزمون
پس‌آزمون	پیش‌آزمون	۱	۴/۷۷	۷/۴۶	۰/۰۱	۰/۲۴	۰/۸۴
(قند خون ناشتا)	عضویت گروهی	۱	۴/۱۸	۶/۵۴	۰/۰۱	۰/۲۲	۰/۸۶

به صورت گروهی برای افراد مبتلا به بیماری دیابت ارائه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر افزایش احساس عاملیت و مؤلفه‌های آن (خوشبینی خودکارآمدی و هدفمندی) بود. این آموزش علاوه بر این موجب کاهش میانگین هفتگی نمرات قند خون ناشتا بیماران دیابتی در دوره‌ی درمان گردید. در واقع آموزش ایمن سازی در مقابل استرس توانست به طور معناداری نمرات

نتیجه‌گیری و بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر افزایش احساس عاملیت و کاهش میانگین قند خون ناشتا بیماران دیابتی بود. به همین منظور در این پژوهش، درمان بر اساس راهنمای عملی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس به روش مایکنباوم (۲۰۰۸) در قالب ۶ جلسه‌ی درمانی ۹۰ دقیقه‌ای

امیری، عسگری مبارکه و عربیضنی: اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابله استرس بر احساس عاملیت...

طرف دیگر استرس حلقه واسط سلامت روان و تن بوده و باعث ایجاد پیوند قوی بین حالات روانی و جسمانی است (لاؤلو ۲۰۱۵). همچنین برخی تحقیقات نشان داده اند که استرس تاثیر قابل توجهی در شکل گیری و تداوم بیماری دارد (زابلوتسکی^۱، برادشا^۲ و استیوارت^۳، ۲۰۱۳ و وانگ^۴، چن^۵، هسو^۶، لی^۷ وانگ^۸ و یه^۹ ۲۰۱۱). بنابراین می‌توان گفت آموزش ایمن سازی در مقابله استرس توانسته است با کاهش میزان استرس، این احساس را در بیماران دیابتی بوجود آورد که در مقابل شرایط استرس آور بیماری دیابت مثل یک قربانی دست و پا بسته نیستند و می‌توانند با بکارگیری راهبردهایی که آموخته اند بر شرایط محیطی خود تاثیر دلخواه داشته باشند. این تاثیر گذاری مثبت باعث کاهش اختلاف بین خواسته های درمانی بیماران و نتایج حاصل از عمل شان بر محیط و افزایش احساس عاملیت به معنای اختلاف بین تمایل -نتیجه بیماران شده است.

از منظر روانشناسی فیزیولوژیک نیز می‌توان تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابله استرس را بررسی نمود. تحقیقات نشان داده اند پاسخ های غده آدرنال به وقایع استرس آور با انحراف از مقادیر طبیعی هورمون های فیزیولوژیکی، نشان دهنده عملکرد اصلی محور (*HPA*) در سندروم

احساس عاملیت و مولفه های آن را در بیماران افزایش داده و میانگین هفتگی قندخون ناشتای آنان را کاهش دهد.

شواهد متعدد نشان داده اند که بیماری دیابت یک پدیده چند عاملی بوده و بویژه بهبود شرایط روانی بیماران در پیش آگهی درمان و کنترل آن بسیار موثر است (انجمن دیابت آمریکا، ۲۰۱۴). نتایج پژوهش حاضر از این جهت که آموزش ایمن سازی در مقابله استرس منجر به افزایش مثبت در میزان احساس عاملیت می‌شود با مطالعاتی هماهنگ است که نشان می‌دهند مداخلات روانشناختی باعث بهبود ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی شده است. علاوه بر این ارتباط ویژگی های منفی نظیر پائین بودن احساس کنترل بر بیماری به معنای افت شدید احساس عاملیت با عدم رعایت دستورات درمانی کارشناسان دیابت نقش مهمی در نوسانات قند خون ناشتای بیماران بر عهده دارند.

نتیجه‌ی بدست آمده در این تحقیق با نتایج گزارش شده توسط امیری، آقائی، فراهانی، عابدی (۲۰۱۷) مبنی بر موثر بودن آموزش ایمن سازی در مقابله استرس بر علائم روانشناختی بیماران دیابتی و نتایج پژوهش بیات اصغری و همکاران (۲۰۱۵) مبنی بر تأثیر صفات شخصیتی (همانند احساس عاملیت و مولفه های آن)، بر پیروی و تبعیت از درمان در بیماران دیابتی هماهنگ است. به دیگر سخن آموزش ایمن سازی در مقابله استرس توانسته با افزایش احساس عاملیت، باعث افزایش پیروی از درمان و کاهش میزان قند خون ناشتای بیماران دیابتی شود. از

1 .Lovallo, W. R.

2 .Zablotsky, B.

3 .Bradshaw, C.P.

4 .Stuart, E.A.

5 .Wang, L.J.

6 .Chen, C.K.

7 .Hsu, S.C.

8 .Lee, S.Y.

9 .Wang, C.S.

10 .Yeh, W.Y.

شناختی خود که بخشی از اموزش ایمن سازی در مقابل استرس است از بروز آنها جلوگیری نماید. میزان تهدید آمیز بودن اتفاقات زندگی خویش را به اندازه‌ی واقعی براورد نموده و دچار خطای بیش برآورده نخواهد شد. بنابراین حذف بخشی از خطاهاشی شناختی بیمار طی فرایند اموزش ایمن سازی در مقابل استرس، جهانی بهتر و آینده‌ای نیکو را برای او معجم نموده، و باعث افزایش خوش‌بینی آزمودنی‌ها شده است.

مطابق شواهد، اجزای شناختی و جسمانی استرس، در تعامل با یکدیگر حالات هیجانی مثبت و یا منفی را ایجاد نموده و هیجانات منفی ناشی از استرس نیز حالتی از عدم کنترل را در بیماران بوجود می‌آورد (شین ۱۰ و نایچلانی ۱۱، ۲۰۱۸). این هیجانات منفی با کاهش خود کارآمدی و خوش‌بینی همراه بوده و باعث افت احساس عاملیت آنان می‌شود. در این پژوهش اموزش ایمن سازی در مقابل استرس با مجهز کردن بیماران به آگاهی‌های لازم و تکنیک‌های مقابله‌ای سازگارانه در مقابل استرس بر جزء شناختی استرس موثر بوده و باعث کاهش حالات هیجان منفی در بیماران دیابتی شده است.

همچنین شواهد نشان داده‌اند، در اختلال استرس پس از سانحه نقص مزمن فرایندی وجود دارد (کاروال‌هو ۱۲، کومبربا ۱۳، اوتا ۱۴، مل‌لو ۱۵ و

انطباق عمومی است (آرنت ۱، موگلیا ۲، لاریا ۳ و موگلیا ۴، ۲۰۱۶). این محور یکی از سیستم‌های هورمونی اولیه بدن برای پاسخدهی به استرس است (جوستر ۵، مکیون و لوپین ۶، ۲۰۱۰) که در پاسخ به استرسورهای فیزیولوژیکی و روانشناسی، فعال شده و منجر به ترشح هورمون از هیپوتالاموس و به دنبال آن تحریک غده هیپوفیز قدامی به ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک ۷ می‌شود. این هورمون بنوبه‌ی خود سبب آزاد سازی کورتیزول از غده آدرنال شده و منجر به ترشح گلوکوکورتیکوئیدها برای مقابله با شرایط استرس آورمی شود (پیج ۸، ۲۰۱۵). هنگامی که استرس بصورت طبیعی (حذف عامل استرس) یا بواسطه توانائی شناختی مکتبه بیمار از اموزش ایمن سازی در مقابل استرس کاهش یافته، فعالیت محور HPA توسط یک حلقه فیدبک منفی، که کورتیزول را سرکوب و انتشار بیشتر آدرنوکورتیکوتروپیک و CRH را متوقف می‌کند قطع می‌شود (جوزف و گلدن، ۲۰۱۷).

توقف فرایند تولید هورمون استرس از نظر شناختی وابسته به تفسیر بیمار از شرایط زندگی خود است. اگر بیمار واقعی زندگی خود را تهدید آمیز تلقی کند، فرایند تولید هورمون استرس ادامه می‌یابد. و چنانچه بیمار بواسطه شناسائی خطاهاش

-
- 10 . Shin, R.
 - 11 . Nichlany, A.
 - 12 . Carvalho, C. M.
 - 13 . Coimbra, B. M.
 - 14 . Ota, V. K.
 - 15 . Mello, M. F.
-

- 1 . Arnett, M.G.
 - 2 . Muglia, L.M.
 - 3 . Laryea, G.
 - 4 . Muglia, L.J.
 - 5 . Juster, R.P.
 - 6 . McEwen, B.S.
 - 7 . Lupien, S.J.
 - 8 . adrenocorticotrophic hormone (ACTH)
 - 9 . Page, S.
-

شخصی شده و نهایتاً افزایش خوش بینی، خودکارآمدی و هدفمندی او شده و رفتارهای مقابله سازگارانه با استرس را بیش از پیش در روی بر می انگیزد.

در زندگی بیمار دیابتی، تجربه‌ی استرس های منفی، حتمی بوده واز سوی دیگر استرس روان‌شناختی با هیجانهای منفی مرتبط است، بنابراین تجربه‌ی هیجان‌های منفی، میتواند از طریق افزایش رفتارهای پرخطر موجب مشکلات متعددی برای بیمار گردد (کوک^۶، اسپینزولا^۷، فورد^۸، لانکتر^۹، بلوستین^{۱۰} و همکاران، ۲۰۱۷). مطابق محتواهای آموزشی جلسات مداخله، آموزش مهارت‌های مقابله با استرس درکلینیک یا محل آموزش و در حالی که فرد از دور از استرس واقعی است دقیقاً مشابه پیشگیری سطح اول (ترزیق واکسن) در مداخلات پزشکی تمرين می-شوند(شین و نایچلانی، ۲۰۱۸).

درنتیجه بواسطه این مهارت آموزی بیماران برای مقابله با استرسورهای ویژه بیماری دیابت، مانند افکار خودآیند منفی مربوط به عوارض دیابت شامل قطع پا، نفروپاتی و نوروپاتی آمادگی لازم را پیدا نموده و در زمان تولید افکار منفی، این مهارت‌ها را در محیط زندگی خویش بکار می-گیرند. بعبارت دیگر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، باعث ایجاد توانائی ارائه پاسخ موثر و افزایش تعامل فرد با محیط خود در جهت مثبت می‌گردد. بدنبال افزایش مثبت تعامل با محیط

بلنگرو^۱، ۲۰۱۷) که طی آن، عامل استرس با تحریک محور HPA باعث تحریک سیستم عصبی سمپاتیک و آزاد شدن هورمون هائی می‌شود که فرایند فیزیولوژیک استرس را فعال می‌کند (پاراگولیا^۲، پاپی^۳، پونتاکوروی^۴ و کارسلو^۵، ۲۰۱۷). نظیر همین شرایط اختلال استرس پس از سانجه را می‌توان برای بیماران دیابتی در نظر گرفت. شرایطی که استرس ناشی از ابتلاء به بیماری دیابت باعث یادآوری مستمر عوارض دیابت، ایجاد خطای شناختی بیش برآورد (فاجعه سازی) و در نتیجه نقص در احساس عاملیت بیمار بر شرایط بیماری می‌شود. با ادامه احساس ناتوانی بیمار در مدیریت استرس، آسیب وارد به محور HPA نیز دائمی می‌شود. تداوم احساس ناتوانی بیمار، سازوکارهای کنترلی فیدبک منفی را تحت تاثیر قرار داده و سبب می‌شود سطح کورتیزول در خون بیمار همچنان بالا بماند. در این پژوهش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس با تقویت احساس کنترل بر بیماری و برخورد منطقی با افکار منفی مرتبط با بیماری و عوارض آن باعث فعالیت بهتر سازوکارهای فیدبک منفی، و متعاقب آن سرکوبی هورمون کورتیزول و توقف انتشار هورمون کورتیکوتروپیک شده است. درنتیجه می‌توان گفت توقف استرس که بواسطه ارزیابی مجدد مثبت از توانائی های فردی دربیمار بوجود آمده است باعث افزایش آرامش بیمار و تقویت احساس موثر بودن بر فعالیت های

6 Cook, A.

7 .Spinazzola, J.

8 . Ford, J.

9 .Lanktree, C.

10 .Blaustein, M.

1 .Belanger, S. I.

2 .Paragliola, R. M.

3 .Papi, G.

4 .Pontecorvi, A.

5 .Corsello, S. M.

نتیجه گیری کرد، آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس، روش مداخله‌ی مفید، برای کاهش میانگین هفتگی قند خون ناشتا، بهبود احساس عاملیت و مولفه‌های آن در بیماران دیابتی است. و می توان از آن برای درمان این بیماران استفاده کرد.

سپاسگزاری

در پایان از تمامی بیماران شرکت کننده در پژوهش، کارشناسان و کارکنان محترم درمانگاه خیریه و تخصصی ام البنین اصفهان به جهت همکاری در این پژوهش تشکر می‌گردد.

فرد به آینده خوش بین تر شده و دراستفاده از تکنیک‌های اموخته شده در دوره مداخله کارآمد تر می‌شود و درنتیجه خودکارآمدی او نیز افزایش می‌یابد. افزایش خوشبینی و خودکارآمدی در بیماران، دستیابی به هدف درمان را عینی ترمی کند و مجموع این عوامل باعث افزایش احساس عاملیت آزمودنی‌های گروه آزمایش گردید.

در بعد چگونگی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کاهش میانگین هفتگی قند خون ناشتا بیماران می توان عنوان نمود، در بیماران دیابتی بواسطه وجود افکار استرس زای ناشی از بیماری، تولید گلوکز کبدی ۱ که یک فرایند فیزیولوژیک کلیدی مرتبط با استرس و هیجان است دائماً تغییر کرده (لام^۱، کاربن^۲، تیر^۳، لیواز^۴، واندرو^۵، فانتوس^۶ و جی اکسا^۷، ۲۰۰۳) و این تغییر باعث افزایش و یا حفظ سطح بالائی از میزان قند خون می‌شود.

از طرفی در طی دوره مداخله، بیماران با آموخته‌های آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس، توانستند احساس کترل بیشتری بر استرس‌های مرتبط با بیماری و زندگی شان پیدا نمایند و همین امر باعث توقف فرایند تولید گلوکز کبدی (HGP)، بهبود سیستم انطباق عمومی و افزایش مکانیسم‌های بازخورد منفی منجر به کاهش میزان قند خون گردید.

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان

1 . Hepatic glucose production (HGP)

2 . Lam, T. K.

3 . Carpentier, A.

4 . Lewis, G. F.

5 . Van de Werve, G.

6 . Fantus, I. G.

7 . Giacca, A.

منابع

- مجله اصول بهداشت روانی. ۱۷(۲). ۶۸-۶۲.
- سندي، ف.، احشام زاده، پ.، پروين، عسگري وکافي. (۲۰۱۷). رابطه سندروم شناختي-توجهی با اضطراب و افسردگي در بيماران سوختگي: نقش ميانجي سبک هاي مقابله با استرس. *فصلنامه علمي-پژوهشی روان شناسی سلامت*. ۲۳(۲۳)، ۹۱-۷۴.
- هاشمی، ف.، فيلی، ع. ر. و صفاری نیا، م. (۲۰۱۴). اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی-رفتاری) بر سلامت روان زنان نابارور. *فصلنامه علمي-پژوهشی روان شناسی سلامت*. ۱۲(۳)، ۶۴-۵۵.
- Arnett, M. G., Muglia, L. M., Laryea, G., & Muglia, L. J. (2016). Genetic approaches to hypothalamic-pituitary-adrenal axis regulation. *Neuropsychopharmacology*, 41(1), 245-260.
- Amiri, M., Aghaei, A., Farahani, A., & Abedi, A. (2017). The Effect of Stress Inoculation Training (SIT) on Social Dysfunction Symptoms in Diabetic Patients. *Iranian Journal of Positive Psychology*.
- Baker, P., Gill, T., Friel, S., Carey, G., & Kay, A. (2017). Generating political priority for regulatory interventions targeting obesity prevention: an Australian case study. *Social Science & Medicine*, 177, 141-149.
- Brown, S. A. (1992). Meta-analysis of Amirی، محمد. آقائی، اصغر. و عابدی، احمد. (۲۰۱۰). تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران دیابتی. *فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی*. ۱۶(۴)، ۸۵-۱۰۰.
- بييات اصغری، ع.، غرایی، ب.، بنفشه، حیدری، موسی نژاد، وجواهری، آرامون. (۲۰۱۵). بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع ۲. *فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی سلامت*. ۱۶(۴)، ۷۰-۶۰.
- جوکار و رحمتی. (۲۰۱۵). تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل تنش بر اضطراب و کیفیت خواب زنان باردار در سه ماهه‌ی سوم بارداری.
- diabetes patient education research: Variations in intervention effects across studies. Research in nursing & health*, 15(6), 409-419.
- Bühler, T., Kindler, J., Schneider, R. C., Strik, W., Dierks, T., Hubl, D., & Koenig, T. (2016). Disturbances of agency and ownership in schizophrenia: An auditory verbal event related potentials study. *Brain topography*, 29(5), 716-727.
- Carvalho, C. M., Coimbra, B. M., Ota, V. K., Mello, M. F., & Belanger, S. I. (2017). Single-nucleotide polymorphisms in genes related to the hypothalamic-pituitary-adrenal axis as risk factors for posttraumatic stress disorder. *American Journal of Medical*

Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics.

Cavazzana, A., Penolazzi, B., Begliomini, C., Bisiacchi, P.S. Neural underpinnings of the “agent brain”: new evidence from transcranial direct current stimulation. *Eur J Neurosci.* 2015;DOI: <https://doi.org/10.1111/ejn.12937>.

Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., ... & Mallah, K. (2017). Complex trauma in children and adolescents. *Psychiatric annals*, 35(5), 390-398.

David, N., Obhi, S., & Moore, J. W. (2015). Editorial: Sense of agency: examining awareness of the acting self. *Frontiers in human neuroscience*, 9.

Everly Jr, G. S., & Lating, J. M. (2012). *A clinical guide to the treatment of the human stress response*. Springer Science & Business Media.

Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science. *Trends in cognitive sciences*, 4(1), 14-21.

Gentsch, A. (2012). *The Sense of Agency: Neural and Cognitive Correlates of the Self in Action* (Doctoral dissertation, Humboldt Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II).

Jacks LM, Siegel KR, Gujral UP, Narayan KMV. (2016). Type 2 diabetes: A 21st century epidemic. *Best PR act Res Cline Endocrinol Me tab* 2016; 30: 331–343.

Joseph, J. J., & Golden, S. H. (2017). Cortisol deregulation: the bidirectional link between stress, depression, and type 2 diabetes mellitus. *Annals of the*

New York Academy of Sciences, 1391(1), 20-34.

Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2003). The core self-evaluations scale: Development of a measure. *Personnel psychology*, 56(2), 303-331.

Juster, R.P.; McEwen, B.S.; Lupien, S.J.(2010). Allosteric load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. *Neurosis. Biobehav. Rev.* 2010, 35, 2–16.

Khalighinejad, N., Di Costa, S., & Haggard, P. (2016). Endogenous action selection processes in dorsolateral prefrontal cortex contribute to sense of agency: a meta-analysis of tDCS studies of ‘intentional binding’. *Brain stimulation*, 9(3), 372-379.12039604. *Psychologist*, 37, 122-147. *Psychology*, 52, 1-26. *Psychology*, 71(3), 549-570.

Karp, D. A. (2016). *Speaking of sadness: Depression, disconnection, and the meanings of illness*. Oxford University Press.

Lovallo, W. R. (2015). *Stress and health: Biological and psychological interactions*. Sage publications.

Lam, T. K., Carpentier, A., Lewis, G. F., van de Werve, G., Fantus, I. G., & Giacca, A. (2003). Mechanisms of the free fatty acid-induced increase in hepatic glucose production. *American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism*, 284(5), E863-E873.

Meichenbaum, D. (2017). *Stress inoculation training. The Evolution of Cognitive Behavior Therapy: A Personal and Professional Journey with*

Don Meichenbaum, 101.

Moore, J. W., Cambridge, V. C., Morgan, H., Giorlando, F. R. A. N. C. E. S. C. O., Adapa, R., & Fletcher, P. C. (2013). Time, action and psychosis: using subjective time to investigate the effects of ketamine on sense of agency. *Neuropsychologia*, 51(2), 377-384.

National Diabetes Data Group. (1979). Classification and diagnosis of diabetes mellitus and other categories of glucose intolerance. *Diabetes*, 28(12), 1039-1057.

Pacherie, E. (2007). The sense of control and the sense of agency. *Psyche*, 13(1), 1-30.

Paragliola, R. M., Papi, G., Pontecorvi, A., & Corsello, S. M. (2017). Treatment with Synthetic Glucocorticoids and the Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis. *International Journal of Molecular Sciences*, 18(10), 2201.

Piro, M., Zoldow, P. B., Knight, S. J., Mytko, J. J. & Gradishar, W. J. (2001). The Relationship between Argentic and Communal Personality Traits and Psychosocial Adjustment to Breast Cancer. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*, Vol. 8, No. 4, 263-271.

Santos, F. R., Sigulem, D., Areco, K. C., Gabby, M. A., Dib, S. A., & Bernardo, V. . (2015). Hope matters to the glycemic control of adolescents and young adults with type 1 diabetes. *Journal of health*

psychology, 20(5), 681-689.

Shin, R., & Nichlany, A. (2018). The Effects of Stress Inoculation Training in a High Stress Simulated Medical Environment. *Western Journal of Emergency Medicine: Integrating Emergency Care with Population Health*, 19(4.1).

Synofzik, M., Vosgerau, G., Newen, A.(2008). Beyond the comparator model: a multifactorial two-step account of agency. *Conscious Cogn*. 2008;17:219– 239DOI: <https://doi.org/10.1016/j.concog.2007.03.010>.

Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). General perceived self-efficacy. In J. Weinman, S.W& M.Johnston (eds.), *Measures in health Psychology: A User's Portfolio*. England: NFER-Nelson.

Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (2010). The general self-efficacy scale (GSE). *Anxiety, Stress, and Coping*, 12, 329-345.

Zablotsky, B.; Bradshaw, C.P.; Stuart, E.A.(2013) The association between mental health, stress, and coping supports in mothers of children with autism spectrum disorders. *J. Autism and Developmental Disorders*. 2013, 43, 1380–1393.

Zimmet, P. Z. (2017). Diabetes and its drivers: the largest epidemic in human history?. *Clinical diabetes and endocrinology*, 3(1), 1.